



Uyuz Hastalığı Hakkında Bilgilendirme


Uyuz böcekleri (*Sarcoptes scabiei*) deride tüneller açarak bu tünellerin içinde yaşar ve ciltte hastalığa yol açar. Uyuz böcekleri çıplak gözle görülemez, ancak mikroskop altında görülebilir.

Uyuz Nasıl Bulaşır?

Uyuz, kişiden kişiye uzun süreli fiziksel temasla bulaşır. Yatak takımı, giysi ve havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanımı uyuzun bulaşmasını ve yayılmasını kolaylaştırır.


Hastalığın Belirtileri Nelerdir?

- Küçük, deriden hafif kabarık kırmızı döküntüler
- Uykudan uyandıran gece kaşıntısı.
- El, bilek, dirsek, koltuk altı, göbek çevresi, bel, kasık bölgesi, diz ve ayak en çok etkilenir.
- Baş küçük bebekler dışında genellikle etkilenmez.
- Özellikle küçük çocuklarda el iç ve dış yüzü ile parmaklarda belirtiler şiddetlidir.
- Parmaklar arasında çizgi halinde, uyuz böceğinin içinde yaşadığı, gri beyaz renkli tüneller görülebilir.



Hastalığın Tedavisi Nedir?

- Hastanın temas ettiği kişiler de (şikayeti olmasa dahi) aynı anda tedavi edilmeli.
- İlk tercih %5 permetrin içeren krem ve losyonlardır. Permetrin 2 aydan küçük bebeklerde kullanılmaz. Gebe ve emziren anneler güvenle kullanabilir.
- Permetrin başı içermeyecek şekilde boyun dahil tüm vücuda uygulanmalı ve en az 12 saat yıkanmamalı. Bu sürede el yıkanması gerekirse tekrar permetrin uygulanmalı. Bebeklerde baş bölgesine de uygulanmalı. Bir hafta sonra tekrar edilmeli.
- Yıkanma imkanı yoksa ağızdan ivermektin tablet de kullanılabilir. Emziren anneler ve 15 kg üzerindeki çocuklar güvenle kullanabilir. Gebelikte ve 15 kg altı çocuklarda kullanım için doktora danışılmalıdır.
- Tedavi sonrası kaşıntı 2-4 hafta devam edebilir. Kaşıntı için antihistaminik ilaçlar kullanılabilir.



Tanı Nasıl Konur?

Tanı öykü ve fizik muayene bulguları ile konur. Dermoskopi de tanıda yardımcı olabilir.

Derleme:

Uzm. Dr.

Burcu Bursal Duramaz

Uzm. Dr. Zeynep Ergenç